Cancer du sein

caractérisation histopathologique et prise en charge

Anne VINCENT-SALOMON

Pathologie / Genetique / Immunologie

Institut des cancers des Femmes

Institut Curie

Paris

Caractérisation et prise en charge

- **Caractériser** : à quelle maladie avons-nous affaire ?
- **Innovation** : en quoi est-ce utile pour le traitement

Indications

Diagnostic

- Est-ce un cancer ?
- Est-ce une métastase ?
- De quel type de cancer/métastase s'agit-il ?

Biopsie du sein

Mise directement en FORMOL
Pour 6 à 12h.

Biopsie osseuse sous scanner d'une métastase

Biopsie pleurale sous scanner d'une métastase

Biopsie ganglionnaire sous échographie d'une métastase

Pathologie et biologie

Breast Tumours

Edited by the WHO Classification of Tumours Editorial Board

Types de cancer du sein

70%

De type non spécifique
(Canalaire)

15%

Lobulaire

Autres types 15% :

Mucineux

Micropapillaire

Tubuleux

CI-TNS à stroma
riches en
lymphocytes

...

Grade Histopronostique

- Tubes et différenciation
 - > 75% : score 1
 - 10-75%: score 2
 - < 10%: score 3

+

Pléomorphisme
nucléaire

(score 1 à 3)

+

Compte des mitoses sur 10
champs

(score 1 à 3)

Grade = somme des scores

Scores 3-5 = grade I
29%

Scores 6-7 = grade II
41%

Scores 8-9 = grade III 30%

Récepteurs hormonaux : on dit qu'une tumeur est récepteurs hormonaux positive si au moins 10% des cellules tumorales sont positives.

20 à 40 % de tous les cancers du sein sont RO -

60 à 80 % de tous les cancers du sein sont RO +

Groupe de cellules négatives

Définition des classes moléculaires LUM A et LUM B

Table 2. Surrogate definitions of intrinsic subtypes of breast cancer [23]

Intrinsic subtype	Clinicopathological surrogate definition
Luminal A	'Luminal A-like' ER-positive HER2-negative Ki67 low ^a PgR high ^b Low-risk molecular signature (if available)
Luminal B	'Luminal B-like (HER2-negative)' ER-positive HER2-negative and either Ki67 high or PgR low High-risk molecular signature (if available)
	'Luminal B-like (HER2-positive)' ER-positive HER2-positive Any Ki67 Any PgR
HER2	'HER2-positive (non-luminal)' HER2-positive ER and PgR absent
'Basal-like'	'Triple-negative' ^c ER and PgR absent ^c HER2-negative ^c

ESMO guidelines 2019

Adapted from the 2013 St Gallen Consensus Conference [23].

Seuil de positivité du Ki67 ?

^aKi-67 scores should be interpreted in light of local laboratory values: as an example, if a laboratory has a median Ki-67 score in receptor-positive disease of 20%, values of 30% or above could be considered clearly high; those of 10% or less clearly low.

Seuil souvent retenu : 20%
(reco SENORIF, reco St Gallen, monarchE...)

➔MAIS :
valeurs fiables de Ki67 uniquement <5% et >30%

Statut HER2 : recommandations (GEPICS 2021, ASCO 2018/2023)

Fréquence des HER2 faibles et ultra-faibles

HER2 Faibles
Score 2+ non amplifiés & Score 1+

60-65% des cas

- La plupart des HER2 faibles sont HER2 score 1+
- Les HER2 faibles sont :
 - **64% RH+**
 - **36% RH-**

HER2 ULTRA- faibles
Score 0 mais avec 1-10% cellules +

20-25% des cas

Score 3+

Score 2+

Score 1+

Score 0
1-10% cellules +

Score 0
0% de marquage

Hybridation in situ

Amplifié

Non amplifié

Voie de signalisation activée par
l'amplification / surexpression de HER2

Détection de l'expression de HER2 à la surface des
cellules tumorales

Carcinomes HER2 positifs

Carcinomes HER2 faibles

Carcinomes HER2
ULTRA-faibles
1-10%

Carcinomes
HER2 négatifs
0%

2023 ESMO Consensus pour le statut HER2

Table 1. Interpretation by the ASCO/CAP 2018 Guidelines and by the 2023 ESMO Consensus on HER2-low breast cancer regarding each pattern of HER2 staining			
Description of staining	Denomination by 2018 ASCO/CAP Guidelines	Conclusion by 2018 ASCO/CAP Guidelines	Conclusion by 2023 ESMO clinical practice recommendations
- No staining	HER2-0	HER2-negative	HER2-0 <i>HER2-null^a</i>
- Incomplete or faint staining in $\leq 10\%$ of invasive tumor cells	HER2-0	HER2-negative	<i>HER2-ultralow (or >no staining <1+)^a</i>
- Incomplete or faint staining in $>10\%$ of invasive tumor cells	HER2 1+	HER2-negative	HER2-low
- Weak to moderate complete membrane staining in $>10\%$ of invasive tumor cells (ISH-negative)	HER2 2+ nonamplified	HER2-negative	HER2-low
- Weak to moderate complete membrane staining in $>10\%$ of invasive tumor cells (ISH-positive)	HER2 2+ amplified	HER2-positive	HER2-positive
- Intense complete membrane staining in $>10\%$ of invasive tumor cells	HER2 3+	HER2-positive	HER2-positive

ASCO, American Society of Clinical Oncology; CAP, College of American Pathologists; HER2, human epidermal growth factor receptor 2; ISH, *in situ* hybridization.

Bold are the actual definitions. In italics are potential future sub-definitions within the HER2-0 category.

^aThe decision to establish the HER2-null and HER2-ultralow (or >no staining <1+) categories will be dependent on the results of the DB-06 trial.

Carcinomes triple négatifs

RO – et RP – (< 10%), HER2 0, 1+ ou 2+ non amplifié **et grade 3**

15 à 20% des carcinomes infiltrants

Définition des sous types histo-moléculaires selon l'AJCC 2018, 8eme édition

Marqueurs du stroma et des cellules tumorales : PDL1

Contexte : pour les indications d'immunothérapie destinées aux patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique

- Pembrolizumab

- approuvé par la FDA et l'EMA sur des données de survie sans progression
- expression de PDL1 par les cellules tumorales et immunes
- **Biomarqueur validé : CPS $\geq$ 10 (PDL1 IHC clone 22C3)**

Lire les RH, KI67 et HER2 nécessite de

- Maitriser le pré-analytique (fixation Formol)
- Prendre le temps de lire Intensité et % de cellules marquées.
- Vérifier les témoins externes de réactions, les témoins internes (glandes normales)
- Participer aux contrôles de qualité française (AFAQAP) et Européens (UK NEQUAS; NORDIK QC...)

Evaluation du KI67 grâce au machine learning

Solutions d'IA pour l'évaluation des marqueurs théranostiques : vers une standardisation

aiforia Products - Industry - Resources - News - About us - Investors - Login - Book a demo

Aiforia Clinical Suites

Clinical pathology solutions

In the portfolio we have different Aiforia Clinical Suites for some of the most prevalent cancers in the world: prostate, breast, lung, and more...

The Suites are a portfolio of tools containing: a clinical viewer, platform for QC and adaptation and an AI model for diagnostic support. Explore our already CE-IVD marked tools and what's to come!

Only certain Aiforia Clinical AI models and the Aiforia Clinical Suite Viewer are CE-IVD marked for diagnostic use in EU and EEA countries, see here for the full list: www.aiforia.com/aiforia-clinical-suite-viewer. In all other countries, the use is limited to Research Use Only, not for in diagnostic procedures.

Clinical Pathology

VISIOPHARM Research - Diagnostics - Quality - APP Center

Stay ahead

Realize the opportunities of AI-driven precision pathology

Get a demo | Contact us

Prima AI Our solutions | Request a demo

CleoBreast

An AI-powered primary diagnostic solution for breast cancer diagnosis, accredited with CE marking.

Request a demo

Biomarkers detection
Metastasis

DiaDeep

From slides to... scores

!

0-click
No manual region selection

Standardized
Results

Explainable
AI

Paige About - Solutions - Careers - News - Resources

PRESS RELEASE
June 15, 2023

Paige Applies the Power of AI to Improve Breast Cancer Diagnoses with the Launch of its Expanded Breast Suite

Paige

Paige's Robust Suite of AI-Powered Applications Delivers Greater Accuracy, Confidence and Efficiency for Breast Cancer Diagnosis and Reduces the Burden of Manual Diagnosis

NEW YORK - (BUSINESS WIRE) - Paige, a global leader in end-to-end digital pathology solutions and clinical AI applications that assist in diagnosing cancer, today launched the enhanced Paige Breast Suite, a complete set of products designed to empower pathologists in their diagnosis of breast cancer, reduce the subjectivity and tedium of

RECENT NEWS
August 10, 2023
Product Release

IBEX Company - Solutions - Technology - Partners - Resources - Careers - Contact

IBEX BREAST HER2

AI-powered Pathology

Mais l'IA

- Nécessite un process long et rigoureux de développement impliquant des pathologistes
- Une maitrise des biais pour garantir la qualité des algorithmes
- Validation externe +++
- Garantie humaine !

Analyse des caractéristiques biologiques de la métastase

Analyse des caractéristiques biologiques de la métastase

Modifications du statut des récepteurs

- Méta-analyse de 39 études entre 1986 et 2016

Nombre de cas	Changement de statut		
	RO	RP	HER2
Toutes les patientes	19,3%	30,9%	10,3%

- Métastases axillaires, récurrences loco-régionales et métastases viscérales

Statut HER2 entre tumeur primaire RH + et la rechute

Statut HER2 entre tumeur primaire et la rechute :

locale

37.5% de changement de statut

métastatique

41.4% de changement de statut

Au-delà de la pathologie et l'immunohistochimie

Analyses ADN et ARN : « séquençage », « mutations »

=> À partir du tissu tumoral (biopsies, chirurgie) : information sur les cellules tumorales et le stroma

=> À partir de prises de sang

- ADN Constitutionnel
- ADN tumoral circulant

ARN tumoral : « transcriptome »

signatures pronostiques intégrées au parcours de soin

Arbres adjuvant RE+/HER2- Patiente Ménopausée

Préparation de l'ADN ou ARN à partir des blocs fixés et en paraffine (FFPE) de biopsies de la tumeur primitive ou/et de la métastase

Coupes 10µm

- $\geq 4\text{mm}^2$
- $\geq 10\%$ cellules tumorales

Extraction
ADN /ARN

Séquençage tumoral (ADN)

Mutations constitutionnelles de *BRCA1* et *2* à partir d'une prise de sang

- 5% des patientes avec cancer du sein porteuses de mutations constitutionnelles de *BRCA1* ou *2*
- Conséquences :
 - défaut de réparation des cassures double brins de l'ADN
 - instabilité génomique et relai par les autres mécanismes de réparation de l'ADN

DNA Repair Pathways

L'inhibition de PARP induit la mort des cellules déficientes pour les protéines BRCA

Cellule Normale

Cellule tumorale BRCA mutée

Mortalité des cellules tumorales BRCA mutées

ADN tumoral circulant « biopsie liquide »

détection de mutations tumorales dans le sang

ADN tumoral circulant « biopsie liquide » *utilité potentielle*

En conclusion: pour les patients métastatique

- 1) Biopsier la lésion métastatique / la rechute
- 2) Réanalyser RO, RP, HER2
- 3) Déterminer le statut *BRCA1* et 2 Constitutionnel
- 4) Statut *ESR1* sur le ct DNA

Figure 1. Diagnostic work-up and staging of MBC.

Reco ESMO actuelles
Pour les cancers du sein
métastatiques

Table 3. List of genomic alterations level I/II according to ESCAT in advanced breast cancer

Gene	Alteration	Estimated prevalence	ESCAT score	Drug class matched	References
ERBB2	Amplifications	15%-20%	IA	Anti-HER2 monoclonal antibodies HER2 TKIs Anti-HER2 ADCs	Baselga et al., <i>N Engl J Med</i> 2012 ⁵⁵ Krop et al., <i>Lancet Oncol</i> 2014 ⁵⁶ Lin et al., <i>J Clin Oncol</i> 2020 ⁵⁷ Saura et al., <i>J Clin Oncol</i> 2020 ⁵⁸ Rugo et al., <i>JAMA Oncol</i> 2021 ⁵⁹
	Hotspot mutations	4%	IIB	Pan-HER TKIs Anti-HER2 ADCs	Hyman et al., <i>Nature</i> 2018 ⁶¹ Smyth et al., <i>Cancer Discov</i> 2020 ⁶⁰ Li et al., <i>Ann Oncol</i> 2023 ⁶¹
PIK3CA	Hotspot mutations	30%-40%	IA (ER-positive HER2-negative ABC)	α-specific PI3K inhibitors*	André et al., <i>N Engl J Med</i> 2019 ⁶² Rugo et al., <i>Lancet Oncol</i> 2021 ⁶³ Turner et al., <i>N Engl J Med</i> 2023 ⁷⁰
ESR1	Mutations	30%-40%	IA (ER-positive HER2-negative ABC resistant to AI)	SERDs	Bidard et al., <i>J Clin Oncol</i> 2022 ⁶⁴ Bardia et al., <i>Cancer Res</i> 2023 ⁶⁵
BRCA1/2	Germline pathogenic/likely pathogenic variants	4%	IA	PARP inhibitors	Litton et al., <i>N Engl J Med</i> 2018 ⁶⁶ Robson et al., <i>Eur J Cancer</i> 2023 ⁶⁷
	Somatic mutations	3%	IIB	PARP inhibitors	Tung et al., <i>J Clin Oncol</i> 2020 ⁶⁸
PTEN	Mutations/deletions	7%	I/II	AKT inhibitors	Schmid et al., <i>J Clin Oncol</i> 2020 ⁶⁹ Turner et al., <i>N Engl J Med</i> 2023 ⁷⁰
AKT1	Mutations (p. E17K)	5%	I/II	AKT inhibitors	Kalinsky et al., <i>JAMA Oncol</i> 2021 ⁷¹ Turner et al., <i>N Engl J Med</i> 2023 ⁷⁰
PALB2	Germline pathogenic/likely pathogenic variants	1%	IIB	PARP inhibitors	Tung et al., <i>J Clin Oncol</i> 2020 ⁶⁸ Gruber et al., <i>Nat Cancer</i> 2022 ⁷²

ABC, advanced breast cancer; ADCs, antibody–drug conjugates; AI, aromatase inhibitors; ER, oestrogen receptor; ESCAT, ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets; HER, human epidermal growth factor receptor; PARP, poly (ADP-ribose) polymerase; SERDs, selective oestrogen receptor degrader; TKIs, tyrosine kinase inhibitors.

*AKT inhibitors have shown efficacy in patients with PIK3CA mutated ER-positive HER2-negative ABC

Altérations moléculaires (level of evidence I /II) & cancers du sein

En résumé, ce qui est validé et utilisé

Sein précoce

- Type histologique
- Grade
- RE, RP, HER2, KI67

- Signatures pronostiques

- *BRCA* 1 et 2 constitutionnel

Sein avancé (ou métastatique)

- RE, RP, HER2
- PD1/PDL1
- Tumeur et/ou ctDNA
 - *PIK3CA*
 - *NTRK*
- Constitutionnel
 - *BRCA*
 - *PALB2*

En résumé, ce qui est en cours d'innovation

Sein précoce

- Signatures pronostiques
- Nouvelles signatures autres que les signatures commerciales
- Perspectives intéressantes venant des approches basées sur l'intelligence artificielle et l'analyse des lames numérisées

Sein avancé

- Suivi du statut mutationnel *de ESR1*
- Toutes autres anomalies moléculaire avec essai ciblé

Institut
des **Cancers** des
Femmes
institut
Curie

PSL
UNIVERSITÉ PARIS

Inserm
La science pour la santé
From science to health